

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIGI PROIETTI"
SEDE LEGALE VIA MARCO DECUMIO, 25 – 00174 ROMA Tel. 067615987
Cod. M.P.I. RMIC8G6005 – C.F. 97713300586
www.icgigiproietti.edu.it
PEO: RMIC8G6005@istruzione.it; PEC: RMIC8G6005@pec.istruzione.it

Roma, 1 marzo 2023

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI

**E p. c. ALLA DSGA
A TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AL SITO WEB D'ISTITUTO**

CIRCOLARE NR. 207

Oggetto: Open Day Vaccinazioni marzo 2023

Si informano le famiglie degli alunni che il Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Coordinamento delle Attività Vaccinali della ASL ROMA 2, offrirà ai ragazzi nati dal 2007 al 2011 la possibilità di vaccinarsi in accesso libero (nei Centri Vaccinali e nei giorni indicati per tutto il mese di febbraio) per effettuare le dosi raccomandate contro il Papillomavirus, contro il Meningococco, contro lo Pneumococco e contro Difterite, Tetano, Pertosse e Polio.

Le SS. LL. sono invitate a prendere visione degli allegati alla presente circolare nei quali sono riportate le indicazioni per eventuali prenotazioni e brevi note sull'importanza di questi vaccini.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Flavio DE CAROLIS**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

SEDI DI SCUOLA PRIMARIA

DAMIANO CHIESA Via Marco Decumio, 25 tel. 067615987
ALDO FABRIZI Via V. Publicola, 165 tel. 06768097
SALVO D'ACQUISTO Via Selinunte, 3 tel. 067610734

SEDI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

VIA DEL QUADRARO, 102 tel. 06768044
VIALE OPITA OPPIO, 45 tel. 067615785

INVITO ALLA VACCINAZIONE GRATUITA PER I NATI DAL 2007 AL 2011

CONTRO IL PAPPILLOMAVIRUS (HPV) CONTRO IL MENINGOCOCCO (CEPPI ACWY E CEPPO B) CONTRO LO PNEUMOCOCCO (PCV) CONTRO DIFTERITE-TETANO-PERTOSSE-POLIO (DTPP)

AD ACCESSO LIBERO SENZA PRENOTAZIONE
presso qualsiasi Centro Vaccinale, nei giorni e negli orari indicati:

FINO AL 31 MARZO 2023

-  **Centro Vaccinale Affile via Cerchiara 98** (IV Municipio)
tutti i GIOVEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 16.30
-  **Centro Vaccinale via degli Eucalipti 14** (V Municipio)
tutti i MARTEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 16.30
-  **Centro Vaccinale via Cambellotti 11** (VI Municipio)
tutti i SABATO dalle ore 8.30 alle ore 12.30
-  **Centro Vaccinale via Monza 2** (VII Municipio)
tutti i MERCOLEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 16.30
-  **Centro Vaccinale via San Nemesio 21 presso CTO** (VIII Municipio)
tutti i SABATO dalle ore 8.30 alle ore 12.30
-  **Centro Vaccinale via Silone 100** (IX Municipio)
tutti i LUNEDÌ dalle ore 14.00 alle ore 16.30

È necessario presentarsi al Centro Vaccinale muniti di certificato vaccinale.

IN ALTERNATIVA È POSSIBILE PRENOTARE IN ALTRI GIORNI, IN ALTRI ORARI,
IN TUTTI I CENTRI VACCINALI:

- accedendo on-line al sito <http://www.aslroma2.it/index.php/promozione-alla-salute/vaccini>
- inoltrando una richiesta via e-mail a vaccinazionihpv@aslroma2.it indicando dati anagrafici, sede e giorno di preferenza per la vaccinazione

VI ASPETTIAMO!

PERCHÉ È IMPORTANTE VACCINARSI?

Il virus del HPV è responsabile del tumore al collo dell'utero nella donna, ma anche di numerosi altri tumori maligni genitali e orali maschili e femminili, nonché di condilomi e verruche genitali.

La vaccinazione contro il Papilloma virus può prevenire fino a quasi il 90% di tutti i tumori HPV-correlati; inoltre la vaccinazione è più efficace prima di una possibile trasmissione del virus che avviene per lo più per trasmissione sessuale. Il dodicesimo anno di vita è l'età indicata per la vaccinazione anti-HPV nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale.

- **quante dosi servono?** La vaccinazione prevede un ciclo di due dosi nell'arco di circa 6/12 mesi entro i 14 anni. Dai 15 anni in poi servono 3 dosi. Il vaccino può essere co-somministrato con altri.

Il batterio del Meningococco rappresenta la principale causa nel mondo di meningite (infezione delle membrane che avvolgono il cervello e il midollo spinale), ma può provocare anche una sepsi (infezione del sangue).

Non esiste un solo meningococco ma diversi tipi: i ceppi A, C, W135, Y sono la causa di circa il 30-50% delle forme di infezione per le fasce di età più a rischio (bambini, adolescenti e giovani) in Italia; il ceppo B di circa il 40-70% per le stesse fasce di età.

L'infezione può progredire molto rapidamente e diventare potenzialmente fatale nell'arco di 24-48 ore (nel 10-15% dei casi) o lasciare danni permanenti (10-20% dei casi).

La trasmissione avviene per via aerea e attualmente la vaccinazione rappresenta l'unica arma di prevenzione efficace.

- **quante dosi servono?** I vaccini da eseguire sono due. Per il vaccino associato contro 4 ceppi di meningite ACWY è sufficiente una dose. Per il vaccino diretto contro il ceppo B il ciclo prevede 2 dosi. I vaccini possono essere co-somministrati.

Il vaccino anti-Pneumococco previene le più comuni polmoniti batteriche ma anche, meningiti e sepsi (infezione del sangue). Le patologie pneumococciche si verificano durante tutto l'anno e sono più frequenti nei bambini non protetti e negli anziani. Il vaccino può essere co-somministrato con altri.

Il vaccino anti-Difterite, Tetano, Pertosse e Polio è la quinta dose di richiamo obbligatoria di una vaccinazione già effettuata nell'infanzia (tre esavalenti e richiamo dei 6 anni).

Il vaccino permette all'organismo di sviluppare le difese immunitarie in tutta sicurezza, proteggendoci contro malattie, che, altrimenti, potrebbero mettere a rischio la nostra salute e la nostra vita: il richiamo, durante l'adolescenza, è fondamentale per rafforzare la protezione immunitaria.

È importante altresì ripetere una dose di anti-Difterite, Tetano e Pertosse ogni 10 anni durante tutta la vita: si tratta di una vaccinazione prevista dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale e sempre gratuita. Il vaccino può essere co-somministrato con altri.